

予防接種スケジュール

予防接種の種類	接種期間	標準的な接種期間	接種回数	標準的な接種間隔	予防できる病気
ヒブ	生後2か月～60か月 (5歳) 未満	初回接種開始は生後2か月～7か月未満	【開始が生後2か月～7か月未満の場合】 初回接種：3回 追加接種：1回	初回接種：27日（医師が認める場合は20日）～56日 （生後12か月までに完了）	インフルエンザ菌b型が引き起こす、髄膜炎や肺炎、敗血症
			【開始が生後7か月～12か月未満の場合】 初回接種：2回 追加接種：1回	追加接種：初回接種終了後7か月～13か月	
			【開始が生後12か月～60か月（5歳）未満の場合】1回	－	
小児用肺炎球菌	生後2か月～60か月 (5歳) 未満	初回接種開始は生後2か月～7か月未満	【開始が生後2か月～7か月未満の場合】 初回接種：3回 追加接種：1回	初回接種：27日以上（生後12か月までに完了） 追加接種：生後12か月以降に初回接種終了後60日以上	さまざまなタイプの肺炎球菌が引き起こす、髄膜炎や肺炎、敗血症
			【開始が生後7か月～12か月未満の場合】 初回接種：2回 追加接種：1回	初回接種：27日以上（生後12か月までに完了） 追加接種：生後12か月以降に初回接種終了後60日以上	
			【開始が生後12か月～24か月（2歳）未満の場合】2回	60日以上	
			【開始が生後2歳～60か月（5歳）未満の場合】1回	－	
B型肝炎	生後12か月未満	生後2か月～9か月未満	3回	27日以上の間隔をあけて2回接種した後、1回目から139日以上の間隔をあけて1回接種	B型肝炎
4種混合	生後3か月～90か月 (7歳半) 未満	初回接種：生後3か月～12か月未満	初回接種：3回	初回接種：20日～56日	ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ（急性化灰白髄炎＝小児まひ）
		追加接種：初回接種終了後12か月～18か月未満	追加接種：1回	追加接種：初回接種終了後12か月～18か月後 （6か月以上）	
不活化ポリオ	生後3か月～90か月 (7歳半) 未満	初回接種：生後3か月～12か月未満	初回接種：3回	初回接種：20日～56日	ポリオ（急性化灰白髄炎＝小児まひ）
		追加接種：初回接種終了後12か月～18か月未満	追加接種：1回	追加接種：初回接種終了後12か月～18か月後 （6か月以上）	
BCG	生後12か月未満	生後5か月～8か月未満	1回	－	結核
麻しん・風しん混合	第1期 生後12か月～24か月未満	－	1回	－	麻しん（はしか）、風しん
	第2期 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間	－	1回	－	
水痘	生後12か月～36か月未満	初回接種：生後12か月～15か月未満	2回	追加接種：初回接種終了後6か月～12か月後 （3か月以上）	水ぼうそう
		追加接種：初回接種終了後6か月～12か月未満			
ロタ	1価	出生6週0日後から24週0日後までの間	2回	27日以上	ロタウイルスによる下痢症
	5価	出生6週0日後から32週0日後までの間	3回	27日以上	
日本脳炎	生年月日によって接種スケジュールが異なります。詳しくは長沼町保健福祉課（長沼町総合保健福祉センター「りふれ」）保健係までお問い合わせください。				日本脳炎